

16 de octubre.

- COMBINACIONES LINEALES.
- CONJUNTO DE GENERADORES.
- EL SUBESPACIO GENERADO POR UN CONJUNTO.
- DEPENDENCIA LINEAL.
- INDEPENDENCIA LINEAL
- BASES.

DEF.

1) Sea V un F -e.v y $v_1, \dots, v_n \in V$.

Una combinación lineal de los vectores $v_1, \dots, v_n$ es una expresión de la forma

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i.$$

donde $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$.

2) DEF: Sea V un F -e.v., $v_1, \dots, v_n$ y $w \in V$.

Diremos que el vector w es combinación lineal de los vectores $v_1, \dots, v_n$ si existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ tales que.

$$w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i.$$

3) Ejemplos.

a) Cualquier vector $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ es combinación lineal de los vectores canónicos de $\mathbb{R}^3$, $\underline{\bar{e}}_1, \underline{\bar{e}}_2, \underline{\bar{e}}_3$.

$$(a, b, c) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1)$$

b) El vector $(0,0,1) \in \mathbb{R}^3$ no es combinación lineal de los vectores $(1,0,0)$ y $(0,1,0)$

Sup. que existen escalares α y $\beta \in \mathbb{F}$.

tales que $(0,0,1) = \alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0)$

$$\Rightarrow (0,0,1) = (\alpha, \beta, 0)$$

$$\Rightarrow 1 = 0 \quad \forall.$$

Ya sabemos que si V es F -e.v. y $S_1, \dots, S_k$ son subespacios de V entonces.

$$S_1 \cap \dots \cap S_k = \bigcap_{i=1}^k S_i \text{ es un subespacio de } V.$$

4) Sea V un F -e.v. y $\{S_i\}_{i \in I}$ donde S_i es subespacio de V para cada $i \in I$.

entonces. $\bigcap_{i \in I} S_i$ es subespacio de V .

dem:

Por definición $\bigcap_{i \in I} S_i = \{ v \in V / v \in S_i \ \forall i \in I \}$.

- $0_V \in \bigcap_{i \in I} S_i$ ya que $0_V \in S_i \ \forall i \in I$.

- Sean $v, v' \in \bigcap_{i \in I} S_i$, entonces $v, v' \in S_i \ \forall i \in I$.

$\Rightarrow v + v' \in S_i, \ \forall i \in I \Rightarrow v + v' \in \bigcap_{i \in I} S_i$.

• Sea $v \in \bigcap_{i \in I} S_i$ y $\alpha \in F$.

$v \in S_i \quad \forall i \in I$ como S_i es cerrado bajo producto por escalares $\forall i \in I$, entonces $\alpha v \in S_i \quad \forall i \in I$, por lo que $\alpha v \in \bigcap_{i \in I} S_i$ //

5) El subespacio generado por un conjunto.

Sea V un F -e.v. y X un subconjunto de V .
(X puede ser vacío).

Sea $\mathcal{L} = \{ S \mid S \text{ es subespacio de } V \text{ y } X \subseteq S \}$.

Definimos el subespacio generado por X como

$$\langle X \rangle = \bigcap_{S \in \mathcal{L}} S$$

El subespacio generado por X , $\langle X \rangle$,
es el menor de los subespacios de V
que contienen a X . Es decir.

- $X \subseteq \langle X \rangle$
- Si T es un subespacio de V tal que
 $X \subseteq T$ ent. $\langle X \rangle \subseteq T$.

dem:

• P.D. $X \subseteq \langle X \rangle = \bigcap_{S \in \mathcal{L}} S$

Sei $S \in \mathcal{L}$ entmes. $X \subseteq S$.

$$\Rightarrow X \subseteq \bigcap_{S \in \mathcal{L}} S$$

- Sea T un subespacio de V tal que $x \in T$.
(ie. $T \in \mathcal{L}$).

Entonces $\langle x \rangle = \bigcap_{S \in \mathcal{L}} S \subseteq T //$.

6) Sea V un $\mathbb{F}$ -e.v. entonces.

$$\langle \emptyset \rangle = \{0_V\}.$$

dem: Por definición de subespacio generado por un conjunto,

$$\langle \emptyset \rangle = \bigcap S$$

S es subespacio de V .

$$\emptyset \subseteq S.$$

Observemos que cada subespacio de V contiene al conjunto vacío.

En particular el subespacio trivial
contiene al conjunto vacío.

Entonces. $\langle \phi \rangle = \bigcap S \subseteq \{0_V\}$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{S \text{ subespacio de } V.}$
 $\phi \in S.$

$$\Rightarrow \langle \phi \rangle = \{0_V\} //$$

7). Sea V un F -e.v., X un subconjunto no vacío de V . Entonces, un vector $v \in V$ pertenece al subespacio generado por X $(\Leftrightarrow)$ existe un subconjunto finito $X_v = \{v_1, \dots, v_r\}$ de X tal que v es combinación lineal de los vectores $v_1, \dots, v_r$.

Veamos un ejemplo:

Consideremos el F -e.v. $F[x]$ de los polinomios en x con coeficientes en F .

Sea $X = \{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\} = \{x^i \mid i \geq 0\}$.

Sea $f(x) = x^7 - 8x^4 + x^2 - x + 1$.

$f(x)$ es combinación lineal de $x^7, x^4, x^2, x, 1$.

$f(x) \in \langle X \rangle$.

Ahora tomemos $X = \{ x^r \mid r \text{ es impar} \}$.

$$= \{ x, x^3, \dots, x^{2k+1}, \dots \}.$$

el polinomio. $f(x) = 2$ no pertenece a $\langle X \rangle$.

el grado $f(x) = 0$. y por otro lado.

cualquier combinación lineal de la forma

$d_1 x^{r_1} + \dots + d_s x^{r_s}$ donde $r_1, \dots, r_s$ impares
es un polinomio de grado impar.

demostración de (7).

Sea $T = \left\{ \sum_{i=1}^r \alpha_i v_i \mid \alpha_i \in F, v_i \in X, r \in \mathbb{N} \right\}$.

T contiene a X ya que para cada $v \in X$.

$$v = 1v$$

Además, T es un subespacio de V .

$0_V \in T$ pues si $v \in X$ entonces $0_V = 0v$.

Sean $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r$, $w = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_s w_s$.

donde $v_1, \dots, v_r, w_1, \dots, w_s \in X$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s \in F$.

entonces. $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r + \beta_1 w_1 + \dots + \beta_s w_s$.

es una combinación lineal de vectores de X .

por lo que $v + w \in T$.

Sea $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r \in T$ y $\beta \in \mathbb{F}$.

entonces $\beta(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r) = \beta \alpha_1 v_1 + \dots + \beta \alpha_r v_r \in T$.

$\therefore T$ es subespacio de V y $X \subseteq T$.

Ya probamos que el subespacio generado por X , $\langle X \rangle$ es el menor de los subespacios de V que contienen a X , por lo que $\langle X \rangle \subseteq T$.

Problemos ahora que $T \subseteq \langle X \rangle$.

Sea $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r \in T$. ($v_1, \dots, v_r \in X$).

$$\langle X \rangle = \bigcap S$$

S subespacio de V .

$$X \subseteq S$$

Sea S un subespacio de V tal que $X \subseteq S$.

entonces $v_1, \dots, v_r \in S$. Como S es subespacio.

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r \in S \quad \therefore \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r \in \langle X \rangle$$

Observación :

Si X es finito, $X = \{v_1, \dots, v_n\}$.

$$\langle X \rangle = \langle v_1, \dots, v_n \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n d_i v_i \mid d_i \in \mathbb{F} \right\}.$$

8) Beispiel.

$$a) \quad V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \quad X = \left\{ \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\langle X \rangle = ?$$

$$\langle X \rangle = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 3\alpha & -\alpha + \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$b) \quad X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\langle X \rangle = \mathbb{Z}_2.$$

$$\langle X \rangle = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \right\} = M_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

9) Def: Sea V un F -e.v., $V \neq \{0_V\}$.
y X un subconjunto no vacío de V .

Diremos que X genera a V o' que

X es un conjunto de generadores de V

si $\langle X \rangle = V$.

Por ejemplo en 8(b).

el conjunto de las matrices canónicas de 2×2 genera a $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

10. Sea V un $\mathbb{F}$ -e.v., diremos que

V está finitamente generado si existe

un subconjunto finito X de V tal que.

$$\langle X \rangle = V.$$

dicho de otra manera, si V tiene un conjunto finito de generadores.

V está finitamente generado si existen vectores $v_1, \dots, v_k \in V$ tales que

cada vector $w \in V$ se expresa como combinación lineal de los vectores

$v_1, \dots, v_k$.

11) Ejemplos.

a) En $\mathbb{F}^n$, el conjunto de vectores canónicos,
 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ genera a $\mathbb{F}^n$. ya que si

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{F}^n,$$

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = a_1 \bar{e}_1 + a_2 \bar{e}_2 + \dots + a_n \bar{e}_n.$$

b) En el espacio $M_{m \times n}(F)$ el conjunto de las matrices canónicas

$\{ E^{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n \}$ genera a

$M_{m \times n}(F)$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & & \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \sum_{\substack{(i,j) \\ 1 \leq i \leq m, \\ 1 \leq j \leq n}} a_{ij} E^{ij}$$

a). Sea $n \in \mathbb{N}$, y sea.

$$F_n[x] = \{ f(x) \in F[x] \mid f(x) = 0 \text{ o } \text{grado } f(x) \leq n \}.$$

$F_n[x]$ es un subespacio de $F[x]$.

Sea $X = \{ 1, x, \dots, x^n \}$. El conjunto X

genera a $\underbrace{F_n[x]}$.

d) El espacio $F[x]$ no está finitamente generado.

Supongamos $F[x]$ está finitamente generado, entonces existe un número finito de polinomios.

$P_1(x), \dots, P_k(x)$ tales que

$$\langle P_1(x), \dots, P_k(x) \rangle = F[x].$$

SPG. podemos suponer que $\text{grado } P_k(x) \geq \text{grado } P_i(x)$
 $1 \leq i \leq k$.

Sup. que $\text{grado } p_k(x) = m$.

Entonces como estamos suponiendo que

$\langle p_1(x), \dots, p_k(x) \rangle = F[x]$ entonces

X^{m+1} es combinación lineal de $p_1(x), \dots, p_k(x)$.

Esto es. existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ tales que

$$\underbrace{X^{m+1}} = \underbrace{\alpha_1 p_1(x) + \dots + \alpha_k p_k(x)}.$$

Tenemos que .

$$\text{grado}(x^{m+1}) = m+1 \quad \text{y}$$

$$\text{grado}(a_1 p_1(x) + \dots + a_k p_k(x)) .$$

$$\leq \max \{ \text{grado}(p_1(x)), \dots, \text{grado}(p_k(x)) \}$$

$$= \text{grado } p_k(x) = m .$$



Si $f(x)$ y $g(x) \in F[x]$ y $f(x) + g(x) \neq 0$.
 $\text{grado}(f(x) + g(x)) \leq \max\{\text{grado } f(x), \text{grado } g(x)\}$.

12) Ejemplo.

Sea $A \in M_{m \times n}(F)$ y consideremos el sistema

$$AX = 0.$$

Ya sabemos que el conjunto de Soluciones W del sistema $AX = 0$ es subespacio de F^n .

- Si el sistema tiene solución no trivial.

Por ejemplo.

$$x - 2y + 6z = 0$$

$$\Rightarrow x = 2y - 6z$$

x es variable dependiente, y, z variables indep.
Cualquier solución del sistema es de la forma.

$$(2y - 6z, y, z)$$

y el espacio solución del sistema es.

$$W = \{ (2y - 6z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R} \}.$$

$$(2y - 6z, y, z) \stackrel{\downarrow}{=} y \underbrace{(2, 1, 0)} + z \underbrace{(-6, 0, 1)}.$$

$$\text{si } y=1 \quad z=1.$$

$$(-4, 1, 1) = 1(2, 1, 0) + 1(-6, 0, 1).$$

$$\{ (2, 1, 0), (-6, 0, 1) \} \text{ genera a } W.$$

W se llama el espacio solución del sistema.

Queremos encontrar un conjunto de generadores del espacio solución W .

- Si el sistema solo tiene la solución trivial, entonces $W = \{0\}$ y en este caso el vector cero de $\mathbb{F}^n$ genera a W .